

**¿RECIBISTE  
LA LLAMADA**  
de que estuviste  
expuesto a COVID-19?

**HAZ LA LLAMADA**  
sobre XOCOVA.



**XOCOVA es el primer y único comprimido de venta con receta** que se usa en personas de 12 años o más para ayudar a evitar que se enfermen después de la exposición al COVID-19.

COVID-19 = enfermedad por coronavirus 2019.

### **¿Qué es XOCOVA?**

XOCOVA (ensitrelvir) es un medicamento de venta con receta que se usa para ayudar a prevenir el COVID-19 en adultos y niños de 12 años o más tras haber estado en contacto con una persona con COVID-19 (profilaxis posterior a la exposición). Se desconoce si XOCOVA es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

### **Información de seguridad seleccionada**

No tome XOCOVA si es alérgico a cualquiera de sus componentes o si toma determinados medicamentos que pueden interactuar con XOCOVA y pueden causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales o la muerte. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, vitaminas y suplementos a base de hierbas que tome o planee tomar, para que su proveedor de atención médica pueda decirle si es seguro tomarlo con XOCOVA. Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea estarlo, ya que XOCOVA puede dañar al feto.

Consulte la información importante de seguridad en todo el documento y la [información de prescripción](#) completa, incluida la [información para el paciente](#).

# Tenga un plan de exposición al COVID-19 preparado

La exposición al COVID-19 puede producirse en cualquier momento.

Ya sea que asista a un evento con mucha gente, como una boda o un concierto, que se vaya de viaje en familia o que utilice el transporte público, esté preparado para el caso de que se exponga al COVID-19.

Prepárese hablando de forma proactiva con su proveedor de atención médica sobre XOCOVA. De esa forma, puede pedir una receta de XOCOVA para tener a mano por si se expone al COVID-19.

No deje que una  
**ALERTA POR EXPOSICIÓN  
AL COVID-19**  
lo tome por sorpresa

XOCOVA se usa para ayudar a prevenir el COVID-19 en personas de 12 años o más después de la exposición.

**Tome medidas  
y pregunte  
por XOCOVA**

## Información importante de seguridad

### No tome XOCOVA si:

- Es alérgico a ensitrelvir o a cualquiera de los componentes de XOCOVA.
- Toma cualquiera de los siguientes medicamentos, ya que estos pueden interactuar con XOCOVA y pueden causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales o incluso la muerte:
  - apalutamida
  - carbamazepina
  - colchicina
  - dihidroergotamina
  - enzalutamida
  - eplerenona
  - ergotamina
  - finerenona
  - ivabradina
  - lomitapida
  - lumacaftor/ivacaftor
  - lurasidona
  - metilergonovina
  - fenitoína
  - pimozida
  - quinidina
  - rifampicina
  - hierba de San Juan
  - simvastatina
  - triazolam
  - voclosporina

Estos no son los únicos medicamentos que pueden provocar efectos secundarios graves o potencialmente mortales si se toman con XOCOVA. XOCOVA puede aumentar o disminuir los niveles de muchos medicamentos en su organismo. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, ya que durante el tratamiento con XOCOVA podría ser necesario hacer análisis de laboratorio adicionales

# El COVID-19 puede afectar a algunas personas de manera más grave que a otras

El COVID-19 puede afectar a cualquier persona, incluidas personas con ciertos factores de riesgo que pueden tener un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el COVID, como las personas que tienen las siguientes afecciones o rasgos de salud crónicos\*:



**Adultos de  
edad avanzada**



**Obesidad**



**Diabetes**



**Ciertas afecciones  
en los órganos<sup>†</sup>**



**Fumador actual  
o exfumador**



**Sistema inmunitario  
debilitado**

\* Esta no es una lista exhaustiva de todas las afecciones que pueden aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas con el COVID. Es importante que informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas.

<sup>†</sup> Incluye afecciones cardíacas, pulmonares o renales.

**Tome medidas rápidamente  
después de la exposición al  
COVID-19 y pregunte a su proveedor  
de atención médica sobre XOCOVA**

## Información importante de seguridad (cont.)

### No tome XOCOVA si: (cont.)

o ajustar la dosis de sus otros medicamentos. Su proveedor de atención médica podría indicarle qué síntomas específicos debe vigilar, ya que podrían indicar que necesita suspender o reducir la dosis de algunos de sus otros medicamentos.

### Antes de tomar XOCOVA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. XOCOVA puede dañar al feto. En el caso de las mujeres que puedan quedar embarazadas, su proveedor de atención médica comprobará con usted si está embarazada antes de comenzar el tratamiento con XOCOVA. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el uso de XOCOVA y durante 2 semanas después de la última dosis. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el uso de XOCOVA.

Consulte la información importante de seguridad adicional en todo el documento y la [información de prescripción completa](#), incluida la [información para el paciente](#).



## Se ha demostrado que XOCOVA ayudar a prevenir el COVID-19 después de la exposición

En un estudio clínico,  
XOCOVA redujo el riesgo  
de COVID-19 sintomático  
después de la exposición en un

67 %\*

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19, XOCOVA puede ayudar a reducir su riesgo de COVID-19 sintomático si empieza a tomarlo inmediatamente en los 3 días (72 horas) posteriores a la exposición.

\* El riesgo de COVID-19 sintomático se evaluó el día 10 frente al placebo.

**Ayude a reducir el riesgo  
de enfermarse después de la  
exposición al COVID-19**

### Información importante de seguridad (cont.)

Antes de tomar XOCOVA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si: (cont.)

• Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si XOCOVA pasa a la leche materna. **No** amamante durante el uso de XOCOVA ni durante las 2 semanas posteriores a la última dosis de XOCOVA.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Su proveedor de atención médica puede indicarle si es seguro tomar XOCOVA con otros medicamentos. No inicie un medicamento nuevo sin decirselo a su proveedor de atención médica.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XOCOVA?

XOCOVA puede provocar efectos secundarios graves como:

• Reacciones alérgicas, incluidas reacciones alérgicas graves (anafilaxia). Deje de tomar XOCOVA y obtenga ayuda médica de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica: erupción cutánea; urticaria; picazón;

## Inicie XOCOVA inmediatamente después de la exposición al COVID-19


### Tome XOCOVA durante 5 días

Tome 3 comprimidos juntos el día 1, seguido de 1 comprimido al día los días 2 a 5.

Tome XOCOVA aproximadamente a la misma hora todos los días con o sin comida.

**No** deje de tomar XOCOVA sin hablar con su proveedor de atención médica.

XOCOVA viene en un blíster que contiene 7 comprimidos. **No** retire los comprimidos de XOCOVA del blíster hasta que esté listo para tomar la dosis.



El tamaño del comprimido no es el real.



**Los pacientes con seguro comercial elegibles pueden pagar tan solo \$0 de copago\***

\* Se aplican términos y condiciones.

### Información importante de seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XOCOVA? (cont.)

hinchazón de boca, labios, lengua o cara; dificultad para tragar o respirar; opresión en la garganta; mareos o sensación de mareo; dolor en la zona del estómago (abdomen) o vómitos.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de XOCOVA, se incluyen los siguientes: dolor de cabeza, diarrea y tos.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de XOCOVA. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. **Le recomendamos notificar los efectos secundarios negativos de fármacos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).** Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la información importante de seguridad adicional en todo el documento y la [información de prescripción completa](#), incluida la [información para el paciente](#).





# Justo después de la exposición al COVID-19, tome medidas con XOCOVA



XOCOVA es el **primer y único comprimido** que se usa en personas de 12 años o más para ayudar a evitar que se enfermen\* después de la exposición al COVID-19.



Tome XOCOVA lo antes posible, **en los 3 días** (72 horas) posteriores a la exposición a alguien con COVID-19.

\*En un estudio clínico, XOCOVA redujo el riesgo de COVID-19 sintomático en un 67 % el día 10 frente al placebo (profilaxis posterior a la exposición).



**Los pacientes con seguro comercial elegible pueden pagar tan solo \$0 de copago†**

† Se aplican términos y condiciones.

Visite [XOCOVA.com/faqs](https://XOCOVA.com/faqs) para obtener más información sobre las opciones de ahorro de XOCOVA

**Tome medidas. Planifique con antelación.**  
**Cuando recibas la llamada, haz la llamada.**

## Información de seguridad seleccionada

No tome XOCOVA si es alérgico a cualquiera de sus componentes o si toma determinados medicamentos que pueden interactuar con XOCOVA y pueden causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales o la muerte. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, vitaminas y suplementos a base de hierbas que tome o planea tomar, para que su proveedor de atención médica pueda decirle si es seguro tomarlo con XOCOVA. Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea estarlo, ya que XOCOVA puede dañar al feto.

Consulte la información importante de seguridad en todo el documento y la [información de prescripción completa](#), incluida la [información para el paciente](#).

